
Plantes nouvelles pour la Flore atlantique

par J. A. BATTANDIER

Ornithogalum amœnum Species nova. — Bulbus tunicatus, ovoideus. Scapus robustus 2-4 décimètres altus. Folia 3-4 erecta, linearia, glabra, canaliculata, 4-6 millim. lata, scapo subæquilongâ. Flores racemosi racemis 15-20 floris. Bracteæ membranaceæ, hyalinæ, trinerves, amplissimæ, basi valde dilatatæ, apice lanceolatæ, pedicellos amplectantes iisque longiores, perigonio paulo breviores. Pedicelli robusti, atrovirentes, ascendentes, circa 8 millim. longi. Perigonii partitiones oblongæ, obtusæ, 15-18 millim. longæ, 4-5 mill. latæ, lacteæ cum triplici nervo dorsali atrovirente. Filamenta dilatata sub antheris dorsifixis flavisque, abrupte contracta, perigonio tertia parte breviora. Ovarium ovato-oblongum, obtusum. Stylus linearis staminibus æquilongus. Stigma capitatum. Capsula tridyma, 20-22 millim. lata, 12 millim. alta, loculis turgidis. Semina uniseriata, numerosa, tenuiter discoidea, late orbiculata.

Cette belle espèce me fut d'abord envoyée en fleurs par le docteur Vialatte des abords du grand Erg, chez les Beni Abbès. Depuis, le docteur Foley l'a trouvée très abondante aux environs de Kenadsa (Maroc) et l'en a rapportée en fleurs et en fruits. C'est une plante ornementale digne d'être cultivée.

L'*O. amœnum* paraît se rapprocher surtout de l'*O. Reverchoni*, d'Espagne, plante rare qui ne m'est connue que par la figure et la description données dans les *Illustrationes florae hispanicae* de Willkomm, p. 117, tab. CLVIII. Toutefois ce dernier a ses bractées brunâtres et non incolores, bien moins dilatées à la base et les pièces du périanthe un peu différentes. Sa capsule mure ne m'est pas connue ; si elle avait la forme si spé-

ciale de celle de l'*amœnum* leur parenté serait certainement très proche.

A quelle section du genre rapporter notre plante ? Elle a les bractées du *Myogolum nutans* ; par la disposition de ses fleurs ce serait un *Beryllis* ; mais sa capsule tridyme et ses graines en disques minces superposés et marginés n'ont pas d'analogues dans le genre ornithogalle et présentent une grande analogie avec la capsule et les graines du *Dipcadi serotinum*.

Si l'*O. Reverchoni* présentait ces mêmes particularités, il y aurait lieu de faire pour ces deux plantes une section spéciale pour laquelle je proposerais la dénomination *trineuron* rappelant la particularité de leurs pièces du périanthe.

Orchis picta Lois. Chez les Beni M'tir 35 k'l. à l'ouest de Thaza (sous-lieutenant LeJentu).

Andryala Ducellieri Species nova. — Perennis, basi suffruticosa. Caules robusti, erecti, ramosi, albicantes, villosi indumento duplici ; id est pilis ramosis brevibus velutinis et pilis glandulosis longissimis validisque hispidissimi præcipue inflorescentiam versus. Folia sessilia, coriacea, oblonga, undulata, indumento ramoso velutino canescentia, infimis exceptis late auriculato-amplexicaulia, apice attenuata ; floralia parva apice acuta, basi auriculata. Capitula mediocria, breviter æqualiterque pedunculata, in racemo disposita. Pedunculi involucraque, præter indumentum velutinum, valde hispidi pilis albis longissimis glandulosisque. Involucri subhemispherici squamæ uniseriatæ, anguste lineares. Ligulæ aurantiacæ involucrum superantes. Achenia lucescentia costis concoloribus.

Cet *Andryala* fut récolté sur les falaises de Safi par M. Ducellier. Par ses ligules et ses achaines, il se rapproche de l'*A. Mogadorensis* Cosson (Illustrationes, tab. 146). Il s'en distingue par sa couleur blanchâtre, par ses feuilles moins larges et non arrondies, obtuses au sommet, par ses inflorescences longuement hispides ainsi que les pédicelles et les capitules hérissés de poils blancs ou un peu jaunâtres, jamais noirs.
