

---

Description d'une nouvelle espèce  
de *Linaria*

par J. A. BATTANDIER

Notre collègue M. Peltier, ayant eu l'occasion ce printemps de faire une herborisation dans le Sud oranais jusque vers les Beni-

Abbès et le Grand Erg, en a rapporté d'intéressantes récoltes qu'il a bien voulu me communiquer.

Il y avait en particulier des échantillons très développés de *Niclouxia Saharæ* Batt., et de *Diplotaxis Pitardiana* Maire, plantes encore bien peu connues.

Mais sa récolte la plus intéressante était une *Linaria* que je crois devoir décrire comme type spécifique nouveau et que je suis heureux de lui dédier. Voici sa description.

*Linaria Peltieri* species nova sectionis *Linariastrum*, subsectionis *Virgatæ*. — Planta annua, glabra, 10... 20 cm. alta, pluricaulis. Caules ascendentes, simplices vel parce ramosi, ramis aliis sterilibus foliatis foliis oblongis vel subrotundis, aliis floriferis. Folia sessilia, ovato-lanceolata, subobtusata, 20... 25 millim. longa, 3... 7 millim. lata, basi ramorum ternata vel opposita, ceterum alterna, internodiis sublongiora. Bractææ foliis similes, patentés, sensim decrescentes, pedicellos superantes. Pedicelli erecti, firmi, 5... 7 millim. longi. Calyx persistens, ad basim usque 5 partitus, laciniis glabris, subæqualibus, ovato-acutis, accrescentibus, capsula longioribus, diu persistentibus. Corolla cærulea, calcaré adjecto 20 millim. longa. Calcar rectum, pendulum corolla reliqua brevius. Labium superius erectum, bifidum lobis latis apice rotundatis. Labium inferius reflexum, trilobum, palato luteo barbatoque. Stamina didyma, inclusa. Filamenta anteriora longiora et basi papillata. Stylus glaber, filiformis, 4... 5 millim. longus. Capsula sessilis, subglohosa, majuscula. Semina angulosa, triquetra, foveolata.

Hab. Zaouïa, Igli, Mazzer. Aprili maioque florens.

Les deux plantes les plus voisines de notre espèce sont : *L. Warionis* Pomel, et *L. fallax* Cosson. Cette dernière s'en sépare nettement par ses graines discoïdes marginées.

Le *L. Warionis* Pomel en diffère par ses fleurs jaunes à éperon deux fois plus long, ses sépales et ses bractées moins larges etc.

Les *L. laxiflora* Desf. et *virgata* Desf. sont bien plus éloignées.

---