
Un *Allium* nouveau de la Flore algérienne

Par L. DUCELLIER et le D^r R. MAIRE

L'un de nous a récolté, au début de juillet 1921, dans les éboulis argileux d'un ravin au-dessous de la ferme de Redjredj près Brazza, un *Allium* très remarquable, qui croissait, sur ce terrain presque dépourvu de végétation, en compagnie de l'*Allium flavum* L. subsp. *ionochlorum* Maire (*A. Fontanesii* J. Gay).

Nous avons étudié cet *Allium* et nous le cultivons à Alger et à Maison-Carrée. Cette étude nous a montré qu'il constitue une espèce nouvelle

de la section *Schoenoprasum*, dont nous donnons ci-dessous la description.

Allium seirotrichum Duccell. et Maire, n. sp. — Perenne, odore alliaceo donatum, usque ad 50-60 cm. altum; bulbus ovatus bulbillis conicis sessilibus l. interdum pedunculatis praeditus, tunicis membranaceis tenuibus diaphanis fragillimis obvolutus; caulis erectus, glaber, rigidus, teres, fistulosus, sulcatus, usque ad medium foliosus; folia ligula expertia; vagina purpureo-violacea l. violaceo striata pilis retrorsis l. patulis hirtula; limbus subteres, fistulosus, viridis, in facie ventrali subcanaliculatus, ceterum costis parum elevatis, pilis albidis uniseriatis patulo-retrorsis, usque ad 1.-1,5 mm. longis, plus minusve crebris, obsitis angulosus, versus apicem acutum sensim teres et glaber. Spatha bivalvis, floribus brevior; valvae ovato-lanceolatae, 3-4-nerviae, pallidae; inflorescentia bulbillis expers, e sphaeroidea irregulariter expansa; pedunculi inaequales glabri angulati, plus minusve sulcati (in sicco), apice sensim incrassati; perigonium campanulatum, basi subumbilicatum; tepala albo-rosea, oblonga, basi concretescentia, subaequalia, omnia apice rotundata, non l. vix mucronata, exteriora nervo basi late triangulari virescenti praedita; stamina inclusa; filamenta externa infra quartam partem superiorem abrupte dilatata complanata et sepalis aequilata, non l. vix dentata, basi in sepalis inserta, in quarta parte superiore subconica; filamenta interna conica non dilatata basi in petalis inserta; filamenta omnia albida, antherae medifixae ovoideae luteae; ovarium viride, trigonum; capsula in perigonio marcescenti inclusa, trigona, trisulcata, semina elongato-applanata opaca laevia. — Hab. in clivis argillosis Atlantis Algerici prope Brazza, ubi junio exeunte et julio ineunte floret.

Cette remarquable espèce est bien caractérisée par ses filets staminaux externes fortement dilatés-ailés dans leur partie inférieure, à dents latérales esquissées, et par ses feuilles anguleuses à poils blancs plus ou moins rétrorses disposés en séries longitudinales. Son androcée rappelle celui de l'*A. trichocnemis* J. Gay, qui s'en éloigne d'ailleurs par de nombreux caractères, en particulier par la tunique fibreuse du bulbe et par les feuilles planes. Il rappelle aussi celui des *A. cepa* L. et *A. ascalonicum* L.; mais ces espèces ont leurs filets externes à dilatation basilaire bien plus courte et nettement bidentée.