

T CASA
MAIRE-57

PLANTAE RIFANAЕ NOVAE

VEL MINUS COGNITAE

Auctoribus L. EMBERGER et R. MAIRE

FASCICULE 2

(*Extrait d'un mémoire intitulé SPICILEGIUM RIFANUM, en cours de publication dans les Archives scientifiques du Protectorat français au Maroc.*)

Echium canum Emb. et Maire, n. sp. (sect. *Eleutherolepis* De Coincy). — Ab affini *E. sericeo* Vahl differt radice annua, foliis caulinis angustis basi attenuatis (nec rotundatis); achaeniis cristarum acutarum et tuberculorum nitidorum expertibus; calyce 15 mm et ultra (nec 8 mm) longo; floribus longiuscule pedicellatis; bracteis et sepalis anguste linearibus (nec lanceolatis). Squamulae corollinae aequales pilosae valde distinctae. Corollae etiam adultae rubrae, exoletae tandem violascentes.

Hab. in lapidosis schistaceis, nec non in clivis margaceis Atlantis Rifani, in Callitrietis et Quercetis prope Aknoul, Boured; 800-1.200 m. Maio et junio floret.

Thymus Riatarum Humbert et Maire, n. sp. — Ab affini *T. commutato* Batt. differt calycis dentibus posterioribus longioribus, inde labio posteriore usque ad 1/2 (nec usque ad 1/4) fisso, anterioribus labium posterius superantibus; corolla pulchre purpurea; foliis tuberculorum albidorum expertibus; caespitibus extensis densissimis; floribus brevissime pedicellatis.

Hab. in Quercetis et in pascuis rupestribus montis Tazzeka, supra urbem Taza, solo siliceo, 1.500-1.700 m., julio florens.

Hanc plantam, in Atlante Rifano quaerendam, opportunitatis causa hic descriptimus.

Scrophularia eriocalyx Emb. et Maire, n. sp. — Ab affinibus *S. aquatica* L. et *S. auriculata* L. differt caulibus, foliis, sepalis plus minusve villosis; sepalis latissime albo-marginatis (nec angustius fusco-marginatis). Folia simplicia, longe pedunculata, apice rotundata, basi cordata.

Hab. in Cedretis montis Timellatin, solo arenaceo, 1.800-2.000 m.. junio florens.

Galium rifanum Emb. et Maire, n. sp. (Sect. *Aparine* D. C., gr. *Leucaparine* D. C.). — Annum, gracile, exsiccatum plus minusve cinerascens l. fuscescens, nec nigrescens; caulis a basi ramosissimus, ramis plerumque dichotomis intricatis divaricatis, 4-costatis, laevibus. Folia 4-7-na, erecto-patula l. patula nec reflexa, inferiora obovato-oblonga obtusa, superiora lanceolata, omnia plana margine scabridulo parum revoluta, 1-nervia nervo subtus prominulo sub apice evanescente (luce reflexa), apice brevissime mucronulata l. acuta. Panicula ampla confertiuscula, cymis dichotomiarum erectis; cymae confertiflorae, 5-15-florae; pedunculi breviusculi, cymam subaequantes, scabriduli, erecti; pedicelli crassiusculi papilloi erecti l. erecto-patuli, nunquam reflexi, bractea lanceolata acuta vix mucronata breviores, flore et fructu maturo breviores. Corollae albo-cremeae extus papillosae, 1-1,5 mm diam., lobis 3-nerviis, ovatis, breviter et leviter acuminatis acutis. Fructus minuti, atro-fusci, tuberculis hyalinis validis exasperati; mericarpia semi-ellipsoidea l. subreniformia, 1-1,2×0,75 mm.

Hab. in lapidosis schistaceis Atlantis Rifani prope Souk-et-Tnin, ad alt. 1.300-1.500 m., junio florens.

Affinis *G. divaricato* Lamk et *G. parisiensi* L., a quibus differt foliis haud reflexis, caulibus laevibus, cymis densiusculis multifloris, corolla albo-cremea majore; *G. capitato* Chaub. et Bory, a quo recepit herba exsiccata haud nigrescente, foliis et bracteis brevioribus haud aristulatis, cymis minus densis, pedunculis pedicellisque crassioribus, fructibus majoribus validius tuberculatis; *G. glomerato* Desf., a quo differt corollae lobis haud aristatis, pedunculis et pedicellis crassioribus, pedicellis flore brevioribus, bracteis haud aris-

tulatis, cymis densioribus, floribus albo-cremeis nec dilute luteis; *G. Bovei* Boiss. et Reut., a quo recedit floris colore, pedicellis post anthesim haud recurvis, etc.

Leontodon eriopodium Emb. et Maire, n. sp. (sect. *Apargia*) --
Ab affinibus *L. hispido* L. et *L. Balansae* Boiss. et Reut. differt foliorum basi dense fulvo-lanuginoso; a priore porro recedit pilis longe 2-4-furcatis substellatis (nec breviter 2-4-furcatis), achaenii paullo brevioris (6 nec 6,5-7 mm) pappo externo nullo l. e pilis 1-2 simplicibus constituto; a posteriore achaeniis brevibus (6 nec 10 mm), pappi setis minus numerosis, basi conspicue dilatatis nudis (nec usque ad basim vix dilatatam plumosis), involuci phyllis dorso adpresso incano-villosis (nec glabrescentibus l. setis sparsis rigidis praeditis), apice vix nevix albo-ciliatis (nec ciliis albis confertissimis albo-marginatis).

Hab. in rupestribus calcareis montis Azrou, 1.800-2.000 m., junio florens.

Alger Novembre 1927
