

Observations sur quelques plantes du Maroc septentrional

par le

DR. RENÉ MAIRE

IV

Nous donnons dans ce quatrième fascicule (1) une nouvelle série d'observations sur quelques unes des plantes distribuées par notre excellent collègue et ami FONT-QUER dans ses *exsiccata* intitulés *Iter maroccanum* 1928. Ce fascicule, rangé dans l'ordre d'étude (selon la classification de BENTHAM et HOOKER) va des Plantaginacées aux Graminées.

N.° 374. *Plantago serraria* L. v. *laciniata* (Willk.) Pau — Cette plante présente les caractères du type (var. *typica* Maire, n. nom.): feuilles simplement dentées et non laciniées, pédoncules et épis peu allongés, bractées plus petites que le calice. Elle ne peut donc, tout au moins en ce qui concerne la part reçue par nous, être rapportée au var. *laciniata*.

N.° 59. *Quercus cerris* L. — La plante distribuée est le *Q. tozae* Bosc. PAU considère qu'elle est le véritable *Q. cerris* L. Nous ne pouvons accepter cette identification, basée principalement sur l'indication par LINNÉ de son *Q. cerris* en Espagne. En effet la description linnéenne du *Q. cerris* ne peut convenir au *Q. tozae*. LINNÉ dit des feuilles de son Chêne: «*laciniis transversis acutis subtus subtomentosis*»; alors que *Q. tozae* a des lobes foliaires obtus et subtomenteux en dessus et en dessous. De plus LINNÉ cite comme synonyme «*Quercus calyce hispido, glande minore*, BAUHIN, Pinax 420»; les mots «*calyce hispido*», qui s'appliquent

(1) Les fascicules 1-3 ont paru dans *Cavanillesia*, vol. 2, fasc. 1-4, 1929; fasc. 7-12, 1930; vol. 3, fasc. 1-5, 1930.

parfaitement au *Q. cerris* des auteurs, ne peuvent être admis pour le *Q. tozae*. Enfin le *Q. cerris* des auteurs existe en Espagne et en Autriche, ce qui concorde bien avec les indications géographiques données par LINNÉ.

N.° 56. *Orchis incarnata* L. var. *xauensis* Pau et F.-Q. — Cette plante ne peut être séparée, à notre avis, de l'*O. Durandii* Boiss. et Reut.

N.° 54. *Gladiolus illyricus* Koch var. vel forma *majoriflorus* — Par ses anthères plus longues que les filets et par ses stigmates insensiblement dilatés à partir du 1/3 inférieur, cette plante se rapporte au *G. byzantinus* Mill.

N.° 55. *G. illyricus* Koch var. *Reuteri* (Boiss.) — Cette plante est une forme du *G. byzantinus* Mill. ne différant du type que par ses fleurs plus petites, à anthères égalant le filet ou à peine plus longues.

N.° 45. *Cyperus longus* L. forma *microstachya* — Cette plante est le *C. longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Br.-Bl. et Maire.

N.° 27. *Aira uniaristata* Lag. et Rodr. — Cette plante s'éloigne de l'*A. uniaristata* (= *A. Cupaniana* Guss.) par ses gros épillets (3 mm long.) portés sur des pédoncules allongés.