

n. 2171

Page 104

Madrid

2196

Cez Meire

Año = 1.933

Plantae maroccanae novae

auctore D^r R. MAIRE

(Extraits d'un mémoire intitulé

Contributions à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord
fascicule 21

en cours de publication dans les Archives scientifiques
du Protectorat français au Maroc)

1528. *Tamarix ludibunda* Maire, n. sp. (gr. *Vernali-aestivales*) — Arbuscula foliis laete viridibus semiamplexicaulibus; inflorescentiae in ramis novellis et biennibus. Racemi graciles laxi; bracteae herbaceae virides. Flores praeter gynoeceum semper trimerum valde ludibundi: 5-6-7-meri. Sepala ovato-lanceolata l. lanceolata; petala oblonga l. oblongo-linearia, alba. Filamenta alba epidiscalia; antherae atropurpureae muticae. Styli a basi liberi ovario paullo breviores.

Hab. in Imperii Maroccani ditione Ida-ou-Tanan, secus amnem infra cataractas (Immouzer).

1529. *Malope rhodoleuca* Maire, n. sp. — Ab aliis speciebus generis recedit floribus valde minoribus (usque ad 2 cm longis); corolla ex albo rubescente; a *M. multiflora* Trig. albiflora differt foliis elongatis, floribus solitariis, herba tota subglabra.

Hab. in Imperii Maroccani ditione Ida-ou-Tanan: in callitrietis prope Isk, solo calcareo, ad alt. 1300 m.

1549. *Centaurea Gattefossei* Maire, n. sp. (sect. *Gymnocyanus* Maire n. sect.) — Ab affini *C. takredensi* (Coss. nom. nudum) Maire, Contr. 1270, recedit foliis magis dissectis, pilis longis plus minusve lanatis; anthodii phyllis nigro-marginatis; appendicibus spinula unica brevissima praeditis, glaberrimis; achaeniis papposis.

Hab. in pascuis lapidosis Anti-Atlantis, ad alt. 1700-2000 m, solo calcareo nec non micaschistaceo: Tizi-n-Zbeïn; Tizi-n-Taratin.

Cette espèce constitue avec l'espèce voisine *C. takredensis* une section nouvelle du genre *Centaurea*, la section *Gymnocyanus*, voisine de la sect. *Chamaecyanus* Willk., dont elle diffère par l'aréole d'insertion des akènes non barbue et par l'appendice non ou à peine spinescent.

1544. *Marrubium Wernerii* Maire, n. sp. (gr. *Microdonta* Briquet) — Ab affini *M. africano* (R. Lit. et Maire) Humbert recedit verticillastris bomby-



cinis; calycis nervis haud prominulis; dentibus calycinis apice nudis; bracteis parvis.

1554. *Marrubium Wernerii* Maire, n. sp. (gr. *Microdonta* Briquet) — Ab affini *M. africano* (R. Lit. et Maire) Humbert recedit verticillastris bombycinis; calycis nervis haud prominulis; dentibus calycinis apice nudis; bracteis parvis.

Hab. in rupestribus vulcanicis Anti-Atlantis: in montibus Siroua prope Tachokcht, ad alt. c. 1900 m.

1556. *Teucrium* ^{*cinnamatum*} ~~*virgatae*~~ Maire, n. sp. (sect. *Polium*) — Ab omnibus speciebus sectionis recedit indumento undique e pilis brevibus hyalinis cinnamatis, interdum ramosis, pilis glandulosis brevibus et glandulis sessilibus immixtis, constante. Folia obovato-oblonga, basi sensim adtenuata subsessilia, utrinque 2-4-crenata, apice rotundata, viridia. Inflorescentia subglobosa, folia floralia aliis conformia sed reducta. Dentes calycini subaequales ovato-acuminati, patentes. Corolla ochroleuca; filamenta violacea; antherae croceae.

Hab. in rupestribus calcareis Anti-Atlantis: prope Bachkoum ad alt. 1300-1700 m.

1561. *Thymelaea antiatlantica* Maire, n. sp. (sect. *Chlamydanthus*) — Affinis *T. virgatae* (Desf.) Endl., a qua differt habitu magis fruticoso (caulibus lignosis usque ad 15 cm altis); foliis minoribus valde brevioribus et angustioribus; caulibus infra inflorescentiam glaberrimis; floribus minoribus; tubo calycino longius et plus minusve patule villosa.

Hab. in pascuis lapidosis Anti-Atlantis, solo arenaceo, ad alt. 900-1000 m, prope Taliouine.

1563. *Romulea antiatlantica* Maire, n. sp. — E grege *R. Bulbocodii*; valde affinis *R. ligusticae* Parl. a qua differt stylo stamina longe superante; foliis erectis crassis rigidis; polline luteo. A *R. Bulbocodio* (L.) Seb. et Mauri recedit foliis erectis crassis; perigonio intus in fundo albidis. A *R. uliginosa* Kunze differt foliis crassis; spathis haud ferrugineo-striolatis, stylo albo. Ab omnibus porro recedit tuberculi tunicis tenuiter membranaceis, nec coriaceis.

Hab. in scaturiginosis Anti-Atlantis, in montibus vulcanicis Siroua, loco dicto Tizi-n-Ougdour, ad alt. 2500-2600 m.

Descriptiones locupletae in libellum praedictum conferendae sunt.

Julio 1933.