

Sertulum austro-maroccanum

auctoribus D^r R. MAIRE, M. WEILLER, D^r E. WILCZEK.

In hac opella diagnoses breves damus novitatum praecipuarum quas in itinere nostro austro-maroccano aprilii 1934 legimus. Haec novitates mox in MAIRE, *Contributions à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord.* fasc. 23, amplius describentur.

Cakile maritima Scop. var. **susica** n. var. — A var. *edentula* (Jord.) Rouy et Foue. ad quam foliis pallide viridibus et siliquis edentulis accedit, differt statura majore (usque ad 1^m diam.); petalis albis; siliculae articulo superiore vix nevix ancipiili, conico l. ovato, valide 4-5-costato. — Hab. in arenis ad ostium fluminis Sous.

Erodium Botrys (Cav.) Bert. var. **obtusiplicatum** n. var. — A typo differt achaeniis plica saepius unica valde obtusata infra foveolam praeditis; foliis infimis valde dissectis; herba tota parum hirsuta. — Hab. in lapidosis arenaceis prope Khenifra.

* **Trifolium gemellum** Pourret var. **pedunculatum** n. var. — A var. *eu-gemello* Maire recedit capitulis plerisque longe pedunculatis pedunculo saepius folium fulcrantem aequante, inde haud geminatis, laxiusculis (nec confertissimis). A *T. phleoides* Pourr. et ejus var. *Minae* Loj. (= *pseudogemmellum* Thell.) differt praecipue dentibus calycinis linearis-subulatis, basi parum dilatatis — In lapidosis arenaceis prope Khenifra.

Lotus pseudo-creticus n. sp. (Sect. *Pedrosia*) — Habitus *Loti creticci* L. Affinis *L. florido* (Lowe) et *L. Jolyi* Batt.; a priore differt foliis majoribus « petiolatis »; foliolis stipuliformibus haud conformibus; a posteriore recedit dentibus calycinis brevioribus; foliolis stipuliformibus haud conformibus; floribus brevius pedicellatis; bracteis brevioribus; leguminibus brevioribus et crassioribus — Hab. in arenis ad ostium fluminis Sous.

Lotus Simonae n. sp. (Sect. *Stipulati* n. sect.) — Fruticosus, dumos hemisphaericos usque ad 1^m altos et latos efformans; a *L. Roudairei* Bonnet, cui solo affinis, recedit habitu; foliis plerisque 3-foliolatis haud pinnatibus; inflorescentiis longe pedunculatis, folio bracteali praeditis. Folia stipulis veris minutissimis, glandulosis, atropurpureis praedita — Hab.

in alveis lapidosis torrentium ad radices australes Anti-Atlantis prope Tatta, Akka, Foum-el-Hassan.

L. Simonaë et L. Roudairei inter *Lotos* nostrates stipulis veris gaudent et ab aliis speciebus longe abhorrent; ideo in sectionem novam *Stipulatos* eos duximus.

Vicia sativa L. var. **villosa** n. var. — A ssp. *notata* (Asch. et Gr.) differt floribus minoribus (15-18 mm); a ssp. *angustifolia* (L.) Asch. et Gr. leguminibus valde villosis. Ab affini var. *lineari* Lange recedit floribus minoribus — Hab. in oasi Tatta.

Foeniculum subinodorum n. sp. ad interim — Habitus et folia *F. piperti* Presl. a quo recedit umbella terminali multiradiata (usque ad 30-radiata) radiis crassis; odore subnullo — Hab. in alveis lapidosis torrentium ad radices australes Anti-Atlantis prope Imiteq.

Pulicaria hesperia n. sp. — Habitus *P. siculae* (L.) Moris, a qua primo obtutu recedit caudice multicipi crasso lignoso perenni; dein foliis superioribus longioribus vix nevix revolutis; ovario parce et breviter hirtulo; pappo interno pauciseto — Hab. in rupestribus arenaceis Anti-Atlantis occidentalis : in ditione Ahl Sahel; in ditione Tazeroualt; in montibus Kest.

Chrysanthemum carinatum Schousb. var. **chrysoporphyreum** n. var. — A typo (var. *genuino* n. nom.) recedit ligulis undique aureis — Hab. in arenis ad oras Oceani prope Tifnit in ditione Sous, et ad ostium amnis Aourioura.

Satureja Hochreutineri Briq. var. **citriodora** n. var. — A typo recedit odore gravi citrato; dentibus calycinis longe et patule pilosis; floribus purpureis nec albo-roseis — Hab. in rupibus calcareis ad radices Atlantis Medii. inter Khenifra et Kasba Tadla.

Salvia Mouretii Batt. et Pitard var. **violacea** n. var. A typo et var. *marrubiana* (Batt. et Pitard) Maire recedit pilis tectoribus parcissimis, inde herba glabrescente; corolla vivide violacea; a posteriore porro differt corolla parva (10-15 mm longa) — Hab. in arvis argillaceis prope Kasba Tadla.

Ballota vellerea n. sp. — Habitus *B. hirsutae* Benth., a qua differt indumento longe et molliter lanato; limbo calycino minore (4 mm longo) sub anthesi haud patulo — Hab. in rupestribus calcareis Anti-Atlantis infra Ieafen.

Allium album Santi (= *A. vernale* Tin.) var. **purpurascens** n. var. — A typo differt tepalis ex albo demum vivide purpureis — Hab. in rupestribus ditionis Tazeroualt Anti-Atlantis.