

Sertulum austro-maroccanum tertium

auctoribus Dr R. MAIRE et Dr E. WILCZEK.

In hoc novissimo sertulo diagnoses brèves plantarum nonnullarum quas in itinere nostro austro-maroccano aprilii 1935 legimus. Haec novitates ulterius in MAIRE, Contributions à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord, fasc. 24, amplius describentur.

Anethum foeniculoides Maire et Wilczek, n. sp. — Perenne; habitus omnino *Foeniculi* fere aphylli; odor herbae foeniculaceus. Involuca et involucella nulla; umbellae omnes pauci (usque ad 12)-radiatae. Fructus dorso compressus; mericarpiorum costae marginales adplanatae valde elevatae, costis marginalibus mericarpiae alteri adpressae. Styli reflexi stylopodium aequantes l. parce superantes. Odor fructus triti *Cuminum cyminum* L. referens.

Hab. in rupibus arenaceis secus flumen Noun.

Jasonia hesperia Maire et Wilczek, n. sp. — Habitus *J. rupestris* Pomel, a qua differt habitu fruticoso; caulis dense villosus; capitulis foliis supremis involueratis, basi rotundatis (nec adtenuatis); anthodii phyllis subaequalibus; ovario 5-nervio.

Hab. in rupibus arenaceis montis Tachilla ad radices Anti-Atlantis, ad alt. 300-400 m.

Leontodon Garnironii Emb. et Maire, n. sp. (sect. *Oporina*) — Perennis, caespites densos late effusos formans; caudex pluriceps eriopodus. Folia pleraque rosulata, glabra, glaucescentia, pinnatifida. Caules floriferi scapiformes, monocephali l. rarius parcissime ramosi; folia caulina reducta bracteiformia saepius parcissima. Anthodii haud calyculati phylla externa brevia inaequalia, interna longa subaequalia, omnia herbacea dorso parce lanuginosa pilis haud moniliformibus. Corollae aureae anthodio triente longiores. Achaenia homomorpha, haud distinete rostrata, pappo paullo longiore simplici, e. setis 10 basi sensim dilatata connatis, dentatis et pilis longis rarissimis deciduis parcissime plumosis, constante, coronata.

Hab. in rupibus arenaceis montis Kest Anti-Atlantis, ad alt. 1400-1800 m.

Limonium trachycladum Maire et Wilczek (sect. *Ctenostachys*) — Ab affini *L. fallaci* (Coss. ex Wangerin) Maire, cuius habitu gaudet, recedit ramis teretibus tuberculatis. Hac nota *L. Chazaliei* (Boissieu) Maire, *L. pruinosum* (L.) O. K. et *L. Brunneri* (Webb) O. K. refert; a primo recedit foliis apice integris, bractea inferiore spiculae parva, tubo calycino semiglabro, limbo secus nervos glabro; a secundo spiculis 1-2-floris et bractea interna haud convoluta; a tertio ramis sterilibus haud pungentibus, caulinis floriferis foliosis; bracteis glabris, calycis tubo semi-glabro.

Hab. in pascuis aridis prope amnem Aourioura, aprilii florens.

Traganopsis nov. genus *Chenopodiacearum* — A *Tragano* Del. differt floribus in glomerulum congestis; perigonio fructifero (sicut in *Tragano* indurato) 2-3-cornuto; staminodiis inter stamina conspicuus, cum staminibus in discum conspicuum basi conniventibus; semine verticali. Proxima *Nucularia* Batt. differt foliis oppositis; floribus 2-3-nis; perigonio haud spinoso; staminodiis nullis.

Traganopsis glomerata Maire et Wilczek, n. sp. — Fruticulus erectus, ramis eburneis glabris, habitu *Tragano nudatum* Del. referens. Folia alterna, glauca, glabra, eis *Tragani nudati* similia sed longiora. Flores in glomerula subglobosa, 8-10 mm diam. congesta. Perigonium 5-sepalum, demum valde incrassatum et induratum, sepalis basi in tubum extus lanatum coalitis, externis 2 (rarius 3) post anthesim cornu dorsali spinosis, omnibus obtusissimis erosio-denticulatis enerviis. Filamenta 5 basi cum staminodiis ovatis pilosulis in discum altum inserta; antherae exsertae ovatae haud mucronatae. Semen verticale, testa membranacea, exalbuminatum; embryo spiralis; radicula supera lateraliter prominula.

Hab. in halipediis vallis fluminis Noun, et in pascuis aridis subsalsis inter Labiar et Aourioura, aprilii florens et fructifer.