
Micromeria Brivesii
Nouvelle Espèce du Maroc

par J. A. BATTANDIER

Perennis, herbacea, pilis brevibus crispulisque undique hirta, cinerea. Caules erecti (1-2 dm), plus minusve ramosi, dense foliosi. Folia sessilia, obtusa, parva, marginibus valde revoluta, iis *thymi vulgaris* similia. Cymæ axillares, unifloræ. Calix glandulosus glandulis nitidis, sessilibus; apice pedicelli 1 mm. longi articulatus, subcylindricus, 3 ½ mm. longus, 1 mm. latus, 13-15 nervius nervis rubellis, prominentibus, 5-dentatus dentibus erectis, acutis, in labio inferiore circa 1 mm. longis, in superiore ½ mm. Corolla parva, rubella, extus hirtella, tubo exserto, labio superiore rotundato, emarginato, inferiore trilobo lobis rotundatis. Stamina antica subexserta, loculis antherarum basi divergentibus. Stylus subexertus, breviter bifidus, partitionibus latis, ovatis, subrecurvis, concaviusculis, superiore basi leviter gibba. Nuculæ oblongæ, obtusæ.

Cette plante fut récoltée par le professeur BRIVES près de l'Oued Amismiz, le 4 novembre 1909. Sans grands rapports avec les *Micromeria* de la flore atlantique, elle se rapprocherait plutôt de quelques espèces des Canaries comme les *M. lasiophylla* WEBB et *Lachnophylla* WEBB ; mais ses cymes uniflores en font un type bien particulier.